

# 甘肃省药品监督管理局

## 甘肃省中藏药材标准

标准号: YCBZ2019-023

### 瑞 香 狼 毒

Ruixianglangdu

STELLERAE RADIX

本品为瑞香科植物狼毒*Stellera chamaejasme* L. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去杂质及泥土，晒干。

**【性状】** 本品呈圆锥形、纺锤形，有的具分枝，略弯曲，长7~30cm，直径1.5~7cm。表面红棕色或棕褐色，有扭曲纵皱纹及横长皮孔，根头部有数个地上茎残基，尾部分枝或已切除。体轻，质松而韧，不易折断。断面纤维性，具棉毛状纤维，皮部类白色或微黄色，可见异型维管束，木部浅黄色。气微，味微甘而辛。

**【鉴别】** (1)本品横切面：木栓层由数列木栓细胞组成。皮层窄，外侧有少量纤维群。韧皮部宽广，射线2~3列细胞，略弯曲；纤维成束散在。形成层环状。木质部呈环状，内侧有1~2环异型维管束，偶见成放射束状。薄壁细胞含满淀粉粒。

(2)取本品粉末1g，加乙醇25ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取瑞香狼毒对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(中国药典2015年版四部通则0502)试验，吸取上述两种溶液各5~10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚(30~60 $^{\circ}$ C)-乙酸乙酯-丙酮(6: 2: 1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】** 水分 不得过12.0%(中国药典2015年版四部通则0832第二法)。

总灰分 不得过 7.0%(中国药典 2015 年版四部通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%(中国药典 2015 年版四部通则 2302)。

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（中国药典 2015 年版四部通则 2201)测定，用乙醇作溶剂，不得少于 16.0%。

**【炮制】** 除去杂质，入牛奶中煮 1~2 小时，取出，晾干。

**【性味与归经】** 辛，苦，平。有大毒！归肺、心经。

**【功能与主治】** 峻下逐水，破积，杀虫，止痛。用于胸腹积水，水肿喘满，心腹疼痛。外用治疥癣，恶疮，杀蝇蛆。

**【用法与用量】** 1~2.5g。外用适量，鲜品磨汁涂或研末调敷。

**【注意】** 本品有毒，内服宜慎，体弱者及孕妇忌服。不宜与密陀僧同用。

**【贮藏】** 置通风干燥处。按《医疗用毒性药品管理办法》规定专柜管理。